

El estigma permite ver con antelación la enfermedad mental? Un estudio con enfermos de HIV/AIDS y Cáncer en la Provincia de Gauteng, Sudáfrica

Resumen

Objetivo: Este estudio tiene el objetivo de explorar si pacientes con HIV sufren más estigma do que pacientes con cáncer y las consecuencias y el entendimiento del estigma en la salud mental. Método: Por medio del diseño factorial, los datos han sido colectados de una muestra conveniente de 100 pacientes diagnosticados con cáncer e HIV en clínicas e hospitales de la Provincia de Gauteng. La mayoría de los participantes eran del sexo femenino 62 (62,0%) y 38 (38,0%) eran del sexo masculino. La edad de los participantes ha variado del 20 al 73 años con promedio de edad de 44.4 años (DP 44,4).

Resultado: Los resultados han revelado un efecto significativo para el estigma efectivo $F = (1.98), = 17.629, p < .001$ y ansiedad $F = (1.98) = 5.750, p < .001$. El Test de Bonferroni (post-hoc) también ha mostrado que los pacientes con HIV han

presentado una puntuación promedio superior de estigma efectivo ($\bar{X} = 4.22$) de lo que los pacientes con cáncer ($\bar{X} = 1.28$) y pacientes con HIV también han relatado más ansiedad ($\bar{X} = 8.81$) de lo que los pacientes con cáncer ($\bar{X} = 6.42$). El estigma efectivo ha influenciado significativamente el Total de GHQ, ($F = (98) = 1.700, p < .05$); Ansiedad ($F = (97) = 2.578, p < .004$); y Depresión ($F = (1.98) = 1.452, p < .05$). No hubo efectos significativos principales para el estigma sentido internamente y disfunciones psicológicas. Conclusão: Las recomendaciones han incluido adaptar las intervenciones para que atiendan las necesidades culturales de los pacientes. Otras recomendaciones han sido hechas en conformidad con las conclusiones del estudio.

Palabras-claves: HIV, Cáncer, Estigma Mental, Salud Mental.